


**SEMÁFORO DE ALERTA: RIESGO MEDIO**



Amigo productor, se ha observado un incremento de pulgón amarillo en el cultivo de sorgo es importante que estés pendiente de tu cultivo.

1. Mantén una continua vigilancia de tu parcela, revisala dos veces por semana.
2. Recorre las orillas de la parcela y busca el pulgón debajo de las hojas, si encuentras mielecilla o negrilla ya esta el pulgón en tu parcela.
3. Aplica las recomendaciones oficiales de control de la plaga y protege los insectos que se comen al pulgón como las catarinas.
4. Solo cuando sea necesario utiliza los insecticidas. Los productos químicos recomendados se encuentran en el reverso de esta hoja.



5. Para evitar intoxicaciones, cuando apliques insecticidas utiliza equipo de protección como overol, botas, mascarilla y guantes.
6. Si tu cultivo esta por terminar el ciclo sigue revisando tu parcela, la alta infestación de pulgón puede dificultar la cosecha y reducir la calidad del grano.

### Cuadro básico de insecticidas para el control químico del pulgón amarillo del sorgo.

Nombre genérico o ingrediente activo	Nombre comercial del producto	Dosis /ha	Período reentrada (hr)	Días a cosecha después de la última aplicación
Flupyradifurone	Sivanto prime	200 ml	4	21 para grano 7 para forraje
Sulfoxaflor	Toretto	50 - 100 ml	24	14 para grano 7 para forraje
Imidacloprid	Admire, Citlalli, Comando, Confial, Confidor, Confol, Dinastia, Helmidor, Imdrakone, Keeper, Kohinor, Mos Blanc, Rotaprid, Velfidor, Confimate , Singular.	100-300 ml	12	7 días
Thiametoxam	Actara, Silverium, Mito 25 WG	100-150 g	12	7 días
Spirotetramat	Movento	300 ml	12	7 días

Si necesitas asesoría comunícate al CESAVERG a los teléfonos 462 6269686 y 462 6260888.